

Neue mittel- und südamerikanische Argini.

(Hym.)

Von Fr. W. Konow, p. - Teschendorf.

(Schluss.)

3. **G. alterna** n. sp. ♀. *Nigra; prothorace, mesonoti dimidio anteriore, tegulis, mesopleurorum limbo posteriore testaceis; abdominis dorso basin versus fusco, pallido-pellucente; palpis, metapleuris, ventris basi, pedum coxis, trochanteribus, femoribus, tibiaram basi e luteo albescentibus; tibiis apicem versus e fusco nigricantibus; tarsis nigris; alis fuscis, sub stigmatate latius subhyalinis; venis et stigmatate nigris.*

Elongato-ovata, nitida; capite breviter fusco-, pronoto, mesonoti parte anteriore, mesopleuris luteo-pilosulis; capite pone oculos fere truncato, medio subemarginato; labro lato, apice emarginato; clypeo late truncato; antennis nigris, nigro-pilosis, abdomen longitudine fere aequantibus; fronte intraantennali carinatim elata, supraantennali subconvexa; foveola supraantennali angusta; ocellis longius sub linea oculos tangente positus; vertice crassiusculo, longitudine sua duplo latiore; alarum superiorum cellula 2. cubitali radium versus fortiter dilatata; nervo areali mox pone medium cellulae discoidalis et paullo ante apicem areae humeralis sito; vagina mediocri, apice rotundata. — Long. 7 mm.

Patria: Brasilia (Itaituba).

4. **G. perata** n. sp. ♀. *Testacea; mandibulis, capite supraantennali, antennis, mesonoto, scutello — apice excepto —, abdominis segmentis octavo et nono vaginaeque apice, tibiis posticis — basi excepta —, tarsis posterioribus nigris; tarsis anticis subfuscis; tegulis fusco-lituratis; alis medio fuscescenti-hyalinis, basi, area intercostali, apice poststigmatali fuscis; venis nigris, costa nigro-fusca, stigmatate pallide fusco.*

Elongato-ovata, nitida; facie inferiore et mesopleuris luteo-, sincipite et mesonoto nigro-pilosulis; capite pone

oculos fortiter angustato; occipite vix emarginato; oculis magnis, os versus convergentibus; labro et clypeo emarginatis; antennis abdomen longitudine aequantibus, longius nigro-pilosis; articulo 3. apicem versus compressiusculo et angustato, apice acuminato; fronte intraantennali carinata, non elata; foveola supraantennali subimpressa; fronte supraantennali subconvexa; vertice longitudine sua duplo latiore; alarum superiorum cellula 2. cubitali radium versus subdilatata, nervum 2. medialem pone medium recipiente; nervi discoidalis et cubiti intervallo nervum 1. cubitalem longitudine superante; nervo areali medium cellulae discoidalis attingente; vagina mediocri, apice fere truncata et luteo-pilosa. — Long. 6,5 mm.

Patria: Brasilia (Obidos).

Von Herrn A. *Ducke* entdeckt. Die Art steht der *G. analis* Cam. nahe, ist aber durch die ganz schwarzen und etwas kürzeren Fühler, die schwarze Costa und das braune Intercostalfeld, auch durch den deutlich ausgerandeten Clypeus und die vorn nicht eingedrückte Lippe sicher verschieden.

5. **G. galumnata** n. sp. ♀. *Testacea; antennis — articulo primo excepto —, mesonoto, scutello, abdominis extremo apice, pedum posteriorum tarsis tiliarumque apice nigris; tarsis anterioribus apicem versus fuscis; alis fuscis, medio late subhyalinatis, longius nigropilosis; venis et stigmatibus obscure fuscis.*

Elongato-ovata, subnitida; capite et mesopleuris luteo-, mesonoto fusco-pilosulis; capite pone oculos truncato; palpis longius pallido-ciliatis; labro apice impresso; clypeo late truncato; antennis nigro-pilosis, abdomen longitudine fere aequantibus; articulo tertio compresso, apicem versus minus longe acuminato; fronte intraantennali carinatim elata, supraantennali subconvexa, medio subimpressa; foveola supraantennali nulla; vertice inde ab ocellis declivi; alarum superiorum cellula 2. cubitali radium versus fortiter dilatata; nervo areali longius pone medium cellulae discoidalis sito, areae humeralis apicem attingente; abdomine apice angustato; vagina crassiuscula, apice truncata. — Long. 6 mm.

Patria: Brasilia (Itaituba).

6. **G. amictoriana** n. sp. ♀. *Testacea; capite — ore et frontis infraantennalis apice exceptis —, antennarum*

articulo tertio, mesonoti dimidio anteriore, mesopleurorum medipectorisque maiore parte, abdominis extremo apice, tarsis posterioribus nigris; tarsis anticis et tibiis intermediis apicem versus superne, tibiaram posticarum 2 partibus apicalibus nigratis; scutello medio fuscoliturato; alis fuscis; venis et stigmatate nigris.

Obovata, nitida; abdomine fere coniformi; sincipite et mesonoti parte anteriore nigro-, mesonoti parte posteriore et ore testaceo-pilosulis; mesopleuris fere glabris; capite pone oculos fere truncato; palpis brevibus, longius pallidopilosis; mandibulis apice obscuratis; labro lato, apice emarginato; clypeo brevi, apice late truncato; antennis abdomen longitudine aequantibus; articulo tertio dense et longe nigro-piloso, compresso, apicem versus attenuato; fronte intraantennali carinatim elata, supraantennali subconvexa, medio transverse subdepressa; foveola supraantennali punctiformi; ocellis sub linea oculos tangente positus; vertice brevissimo, ocelli diametrum longitudine vix aequante; alarum superiorum cellula 2. cubitali radium versus fortiter dilatata; nervo areali longius pone medium cellulae discoidalis sito; vagina non exserta, apice occlusa et fusco-pilosula. — Long. 6 mm.

Patria: Peru (Pachitea).

7. **G. cultricornis** n. sp. ♀. *Nigra, subtus testacea; mandibulis fuscis, summa basi pallidis; labro, clypeo, fronte intraantennali, antennarum 2 articulis basalibus — superne nigratis —, abdominis segmento 2. dorsali e luteo albicantibus; pronoti angulis anterioribus deflexis, thoracis toto latere inferiore — mesopleurorum summa parte subalari excepta —, ventre — apice excepto —, pedibus testaceis; tibiaram posticarum apice interiore nigro-maculato; tarsis posticis nigris; alis hyalinis, superiorum areis intercostali et radiali fuscis, radiali ad marginem exteriorem versus dilutiore; venis fuscis, stigmatate obscure testaceo.*

Subelongata, minus nitida; facie et mesopleuris cano-, sincipite et mesonoto brevissime et densissime nigropilosulis; capite pone oculos celeriter rotundato, fere truncato; oculis magnis, mandibularum basin fere attingentibus, os versus fortiter convergentibus; clypeo a fronte separato, apice rotundato-truncato; antennis thoracem longitudine superantibus; articulo 3. fortiter compresso, lato, cultriformi, breviter nigro-piloso; fronte intraantennali angustissima, non elata, supraantennali depressa, circum

ocellum inferiorem impressa; fovea supraantennali deleta; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis; vertice mox pone ocellos declivi; alarum superiorum cellula 2. cubitali ad radium versus fortissime dilatata; nervo 2. cubitali S-formi; nervo 2. mediali fere interstitiali; nervo areali cellulae discoidalis medium attingente; alarum inferiorum area humerali brevissima; vagina mediocri, apice rotundata. — Long. 9 mm.

Patria: Bolivia (S. Antonio).

9. Gen. **Tanymeles** n. g.

(aus *ταννειν* = strecken und *μελος* = Glied).

Schizoceridum genus. Corpus parvum, elongato-ovatum. Caput latum et breve, pone oculos fere truncatum. Palpi mediocres, maxillares longiores, 6-articulati. Oculi magni, os versus convergentes. Antennae breviores, feminae hirsutae; articulis basalibus latitudine sua longioribus; articulo secundo primum longitudine superante; tertio apicem versus compresso. Ocelli in arcu et sub linea oculos tangente positi. Alae cellula appendiculata carentes; superiores 3 cellulis cubitalibus instructae, nervo primo cubitali deficiente; nervi discoidalis et cubiti intervallo nervum 1. cubitalem longitudine superante; stigmatem lato, oviformi; costa crassa, aream intercostalem fere delente; areae humeralis cellula basali minima; alarum inferiorum humero et area humerali deficientibus. Tibiae posteriores incrassatae.

1. **T. hilarulus** n. sp. ♀. *Testaceus; capite — palpis et fronte infraantennali exceptis —, antennis, 2 mesonoti maculis in apice antescutellari loborum lateralium sitis, abdominis apice inde a segmento octavo, tibiis posterioribus — summa basi excepta —, tarsis omnibus nigris; clypeo et mandibulis fuscis; alis hyalinis, summa basi et summo apice fuscis; venis et stigmatem nigris.*

Ovatus, nitidus; facie infraantennali cano-, supraantennali et sincipite nigro-, mesonoto et mesopleuris fusco-pilosulis; capite pone oculos truncato, occipite emarginato; clypeo subruguloso, apice emarginato, a fronte discreto; antennis corporis dimidium vel abdomen longitudine aequantibus, nigro-pilosis; articulo 1. obscure testaceo; tertio apice compresso et acuminato, a latere invisio ante apicem fere dilatato; fronte intraantennali carinatim elata; fovea supraantennali punctiformi; vertice

longitudine sua fere triplo latiore; alarum superiorum cellula 2. cubitali radium versus valde dilatata, nervum 2. medialem ante medium excipiente; nervo areali pone medium cellulae discoidalis sito; vagina mediocri, apice rotundata et fusco-pilosula. — Long. 5 mm.

Patria: Brasilia (Itaituba).

10. Gen. **Sericoceros** **Brullé.**

1. **S. calanticatus** n. sp. ♀. Testaceus; capite supra-antennali et tarsis nigris; antennis fuscis, articulo primo testaceo; tibiaram margine exteriori magis minusve infuscato; alis superioribus fuscis, apice poststigmatali et alis inferioribus fuscescenti-hyalinis; costa et stigmate nigris, ceteris venis fuscis.

Ovatus, nitidus; facie inferiore cano-pilosula; sincipite fusco-, mesonoto et mesopleuris luteo-pubescentibus; capite brevi, pone oculos fere truncato; labro apice rotundato; clypeo late truncato; antennis brevibus, thorace vix longioribus; articulo tertio breviter piloso, subcurvato, compressiusculo, apice non attenuato; fronte infraantennali brevi, intraantennali non carinata, supraantennali depressa, subtriangulari, circa ocellum inferiorem subimpressa; vertice longitudine sua triplo latiore; alarum superiorum nervo 1. cubitali fere deleto; cellula 3. cubitali ad radium versus fortiter dilatata, nervum 2. medialem in medio excipiente; nervo areali medium cellulae discoidalis attingente; vagina mediocri, vix exserta, apice rotundata. — Long. 7 mm.

Patria: Brasilia (Espírito Santo).

2. **S. ricatus** n. sp. ♀. *Pallide testaceus; capite supraantennali, antennarum articulo tertio, tarsi tibiaramque apice nigris; alis pallide fuscis, sub stigmate fasciatim et medio longitudinaliter hyalinatis; venis fuscis, medio lutescentibus; stigmate pallide testaceo.*

Elongato-ovatus, nitidus; facie inferiore, pronoto, mesopleuris luteo-, sincipite fusco-pilosulis; capite pone oculos rotundato-truncato; labro medio impresso; clypeo truncato; antennis tenuibus, abdomine multo longioribus; articulo tertio nigro piloso; fronte intraantennali carinatim elata; fovea supraantennali nulla; fronte circum ocellum inferiorem subimpressa; vertice inde ab ocellis declivi; alarum superiorum cellulis 2. et 3. cubitalibus inter se fere aequilongis, 1^a brevioribus; nervi discoidalis et cubiti inter-

vallo nervum 1. medialem longitudine superante; nervo areali tertiam cellulae discoidalis partem decedente; vagina non exserta apice cano-pilosula. — Long. 5 mm.

Patria: Brasilia (Itaituba).

3. **S. bigrammatus** n. sp. ♀. *Testaceus; capite supra-antennali, mesonoti 2 vittis lateralibus, tarsis posterioribus — basi excepta — tibiârumque apice nigris; tarsis anticis apicem versus subinfuscatis; antennarum 2 articulis basalibus testaceis, tertio fusco; alis pallide fuscis, sub stigmate fasciatim et medio longitudinaliter hyalinatis; venis fuscis, medio lutescentibus; stigmate fusco-testaceo.*

Elongato-ovatus, nitidus; speciei praecedenti similis et affinis, sed maior; capite pone oculos rotundato-truncato; antennarum articulo tertio fusco-piloso; foveola supraantennali punctiformi; fronte intraantennali carinatim elata, supraantennali sub ocello inferiore impressa; alarum superiorum 3 cellulis cubitalibus anterioribus longitudine decrescentibus; cubiti et nervi discoidalis intervallo nervum 1. medialem longitudine multo superante; vagina vix exserta, apice rotundata, cano-pilosula. — Long. 6 mm.

Patria: Brasilia (Amazonas).

4. **S. declivis** n. sp. ♀. *Testaceus; capite supra-antennali, antennarum articulo tertio, mesonoto, scutello — apice excepto —, abdominis apice (segmentis 6. vel 7.—9. vaginae), tarsorum anteriorum et tibiârum posticarum apice, tarsis posticis totis nigris; alarum superiorum basi et apice poststigmaticali fuscis, tertia parte media lutescenti-hyalina; area intercostali et areae radialis dimidio apicali magis obscuratis; venis nigris, medio e lutescente fuscis, stigmate testaceo; alis inferioribus dilute fuscis, medio dilutioribus.*

Elongatus, nitidus; facie inferiore et mesopleuris luteo-, sincipite, pronoto, mesonoti marginibus fusco-pilosulis; capite pone oculos rotundato-truncato; oculis magnis, mandibularum basin attingentibus; labro medio profunde impresso; clypeo a fronte vix separato, apice submarginato-truncato; antennis gracilibus, compressiusculis, abdomine multo longioribus, apicem versus longe attenuatis; articulo tertio nigro-piloso, super basin curvato; fronte intraantennali altius carinatim elata, supraantennali vix elata circum ocellum inferiorem impressa; foveola supraantennali fere deleta; vertice inde ab ocellis declivi;

alarum superiorum 3 cellulis cubitalibus anterioribus parvis, inter se fere aequilongis; nervi discoidalis et cubiti intervallo nervum 1. cubitalem brevem triplo longitudine superante; nervo areali fere tertiam partem cellulae discoidalis decedente. — Long. 6–7 mm.

Patria: Brasilia (Oyapock).

5. **S. mulsus** n. s. ♂ ♀. *Testaceus; capite supra-antennali, antennis, mesonoti 2 vel 3 maculis interdum confluentibus, tegulis, abdominis apice (segmentis 7.—9. et vagina), pedum tarsis posterioribus, tibiatarum anticarum latere exteriori, intermediis interdum totis, posticarum dimidio apicali nigris; tarsis anticis fuscis; alis, venis, stigmatibus fuscis.*

Elongatus, nitidus; facie inferiore cano-, sincipite et pronoto fusco-, mesopleuris luteo-pilosulis; mesonoto fere glabro; capite brevi, pone oculos rotundato-truncato; oculis magnis, mandibularum basin attingentibus, os versus convergentibus; labro apice impresso; clypeo subemarginato-truncato, a fronte deciso; antennis gracilibus, pilosis, abdomine longioribus, apice attenuatis; articulis 2 basalibus subtus magis minusve testaceatis; feminae articulo tertio compressiusculo, medio curvato; fronte intraantennali altius carinatim elata, supraantennali depressa; foveola supraantennali minima; vertice inde ab ocellis declivi; alarum 3 cellulis cubitalibus anterioribus parvis, inter se fere aequilongis; tertia ad radium versus fere angustata; nervi discoidalis et cubiti intervallo nervum 1. cubitalem longitudine duplo superante; nervo areali tertiam partem cellulae discoidalis decedente; vagina mediocri, non exserta, apice rotundata. — Long. 4–6 mm.

Patria: Brasilia (Pará, Teffé, Prainha, R. Japurá).

6. **S. mammeatus** n. sp. ♂. *Testaceus; capite — ore excepto —, antennis, mesonoto, scutelli apice, tegulis, 2 pectoris maculis lateralibus, abdominis apice, pedum tarsis, tibiatarum anticarum latere posteriore, tibiis intermediis totis, tibiatarum posticarum dimidio apicali nigris; palpis testaceis, apice fuscis; clypeo nigro, apice testaceo, vel toto testaceo; interdum etiam fronte infraantennali pallida; alis fuscis; venis et stigmatibus nigro-fuscis.*

Elongatus, nitidus; facie inferiore cano-, sincipite, pronoto, mesopleuris fusco-pilosulis; capite pone oculos truncato; labro medio profunde impresso; clypeo late truncato; antennis abdomen longitudine multo super-

antibus; articulo primo magis minusve testaceo; fronte intraantennali carinatim elata; fovea supraantennali nulla; vertice inde ab ocellis declivi. Cetera ut in specie praecedente. -- Long. 5 mm.

Patria: Peru (Marcapata), Bolivia (Mapiri).

Dem *S. mulsus* sehr nahe stehend; aber durch andere Färbung, durch breiteren Kopf und das Fehlen der Supraantennalgrube verschieden.

7. **S. procus** n. sp. ♂. *Niger; mesonoto cum scutello et tegulis obscure rufis; lobi medii macula triangulari nigra; scutello medio magis minusve nigricante; pedibus anticis magis minusve pallescentibus; alis fuscis; venis et stigmatate nigris.*

Ovatus, nitidus; ore cano-, sincipite, pronoto, mesopleuris nigro-pilosulis; facie et mesonoto fere glabris; capite pone oculos rotundato-truncato, medio emarginato; clypeo late emarginato; antennis abdomen longitudine aequantibus, medio lutescentibus; fronte intraantennali carinatim elata, supraantennali circum ocellum inferiorem impressa; foveola supraantennali deleta; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis; vertice longitudine sua sesqui latiore; alarum superiorum cellulis cubitalibus 1. et 2. inter se fere aequilongis, tertia brevissima, radium versus angustata; nervo 2. mediali interstitiali aut cellulae 3. cubitalis basi inserto; cubiti et nervi discoidalis intervallo nervum discoidalem longitudine superante; nervo areali medium cellulae discoidalis attingente. — Long. 6 mm.

Patria: Brasilia (Oyapock).

8. **S. ruminatus** n. sp. ♂. *Niger; mesonoto cum scutello et tegulis obscure rufis; lobo medio — apice et lateribus angustis exceptis — nigro; pronoti margine posteriore magis minusve rufescente; abdominis segmentorum dorsalium anteriorum medio magis minusve rufo-translucente; alis fuscis; venis et stigmatate nigris.*

Ovatus, nitidus, fere glaber; ore et mesopleuris fusco-pubescentibus; capite pone oculos rotundato-truncato; clypeo rotundato-truncato; antennis abdomen longitudine superantibus, medio rufescentibus; fronte intraantennali carinatim elata, supraantennali sulcatim impressa, sulco antice acuto, postice dilatato et ocellum inferiorem includente; ocellis superioribus super lineam oculos tangentem positis; vertice longitudine sua parum latiore; alarum

superiorum cellula 3. cubitali 2^a parum minore, radium versus paullulo angustata; nervo 2. mediali fere interstitiali; cubiti et nervi discoidalis intervallo nervum discoidalem longitudine aequante; nervo areali medium cellulae discoidalis attingente. — Long. 5 mm.

Patria: Brasilia (Obidos).

9. **S. coxalis** n. sp. ♂. *Niger; pronoto — medio excepto —, tegulis, coxis, trochanteribus pallide flavis; femoribus et tibiis obscure flavidis, utrobique nigro-imbatis; tarsis nigris; alis fuscescenti-hyalinis; venis et stigmatibus nigris.*

Parvus, nitidus; facie infraantennali cano-, sincipite et mesonoto nigro-, mesopleuris fusco-pilosulis; capite pone oculos truncato; clypeo emarginato; fronte infraantennali et intraantennali acute carinata; antennis abdomen longitudine aequantibus; fronte supraantennali triangulariter subimpressa; vertice brevissimo; alarum superiorum nervo primo cubitali oblitterato; cellula 3. cubitali brevi, longitudine sua fere duplo latiore, nervum 2. medialem ante medium excipiente; cubiti et nervi discoidalis intervallo nervum 1. cubitalem longitudine aequante; nervo areali longius pone medium cellulae discoidalis sito. — Long. 4 mm.

Patria: Brasilia (Obidos, B. Tapajos).

10. **S. socius** n. sp. ♂. *Niger; palpis pallidis; labro et mandibulis piceis aut obscure rufis; pronoto, tegulis, meso- et metapleurorum superiore parte, abdominis lateribus obscure testaceis; ventre — apice excepto — magis minusve lutescente; pedibus nigris; femorum apice testaceo; tibiis albidis, posticarum apice nigro; alis subfuscescenti-hyalinis, apice fere dilutioribus; venis et stigmatibus nigro-fuscis.*

Parvus, nitidus; facie inferiore et mesopleuris cano-, pronoto luteo-pilosulis, sincipite et mesonoto brevissime fusco-pubescentibus; capite pone oculos breviter rotundato, medio emarginato; clypeo apice late emarginato; antennis abdomine longioribus, dilute fuscis, apice obscurioribus, basi nigris; fronte intraantennali carinatim subelata, supraantennali brevi, subconvexa; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis; vertice longitudine sua duplo latiore; alarum superiorum nervo 1. cubitali oblitterato; cellula 3. cubitali cubitum versus non vel vix angustata, latitudine sua apicali vix brevior, nervum 2. medialem

ante medium excipiente; cubiti et nervi discoidalis intervallo nervum 1. cubitalem longitudine aequante; nervo areali fere medium cellulae discoidalis attingente. — Long. 4–5 mm.

Patria: Brasilia (Obidos).

11. **S. pauxillus** n. sp. ♂. *Niger; ore rufescente; palpis pallidis; antennis obscure lutescentibus; tegulis pallido-marginatis; pedibus pallide luteis; tibiaram posteriorum apice et tarsis posticis obscuratis; alis fuscescenti-hyalinis; venis et stigmatibus dilute fuscis.*

Parvus, nitidus; capite et thorace non dense pallido-pilosulis; capite pone oculos truncato; clypeo a fronte vix discreto, apice emarginato; antennis tenuibus, abdomine longioribus; fronte infraantennali et intraantennali acute carinata; foveola supraantennali evidenter impressa, elongata; vertice brevissimo; alarum superiorum nervo 1. cubitali obsoleto; cellula 3. cubitali brevi, longitudine sua sesqui latiore; cubiti et nervi discoidalis intervallo nervum 1. cubitalem longitudine fere aequante; nervo areali medium cellulae discoidalis attingente. — Long. 3 mm.

Patria: Brasilia (Santos).

Die No. 4, 5, 7, 8, 9 und 10 sind von Herrn A. Ducke gesammelt und mir freundlichst mitgeteilt,

11. Gen. **Brachyphatnus** n. g.

Schizoceridum genus. Corpus parvum, ovatum. Caput crassum, pone oculos non angustatum, saepius dilatatum. Palpi mediocres. Oculi os versus convergentes. Antennae tenues, maris bifidae, feminae breves, breviter pilosulae; articulo tertio aequali vel rarius compressiusculo. Ocelli in arcu, inferior in linea oculos tangente, interdum super hanc lineam positi. Alae cellula appendiculata carentes; superiores 4 cellulis cubitalibus instructae; nervo 1. cubitali magis minusve oblitterato; nervo 2. mediali magis minusve interstitiali vel cellulae 3. cubitali inserto; nervo discoidali a cubiti basi minus reiecto, intervallo nervum 1. cubitalem longitudine non superante; nervo areali in medio vel pone medium cellulae discoidalis sito; areae humeralis cellula basali perspicua; alarum inferiorum area humerali brevi, dimidio brachii brevior, rarius apice patula vel tota deficiente. Unguiculi simplices.

Es ist nicht möglich, die kleinen südamerikanischen Arten, die bisher zur Gattung *Schizoceros* gestellt wurden,

auf die Dauer mit der europäischen Gattung zu vereinigen. Die Bildung des Kopfes, der Fühler und besonders des Flügelgeäders ist anders. Deswegen gründe ich für dieselben die obige Gattung. Ob die nordamerikanischen und teilweise die mittelamerikanischen Arten in der Gattung *Schizoceros* bleiben können, muss noch späterer Untersuchung vorbehalten werden. Zur Gattung *Brachyphatnus* kommen die Arten *Schiz. tegularis* und *lateralis* Knw. und die unten zu beschreibenden 3 neuen Spezies, vielleicht auch *Hyl. hypoleuca* Kl. und *Hyl. nigrita* Kl. — Dagegen gehören zur Gattung *Sericoceros* Brullé folgende Arten: *Schiz. albiceratus* und *moniliatus* Knw. sowie *Hyl. flicornis* Kl.

1. **B. nigriceps** n. sp. ♀. *Testaceus; capite, antennis, 2 pectoris maculis, vagina, pedibus nigris; tibiis anticis obscure testaceis; alis fuscis; venis et stigmatate nigris.*

Ovatus, nitidus, fere glaber; capite pone oculos non angustato; clypeo rotundato-truncato; antennis brevibus, caput una cum thorace longitudine vix aequantibus; articulo 3. basi fortiter curvato, apice vix attenuato; fronte intraantennali non carinata; ocello inferiore super lineam oculos tangentem posito; vertice longitudine sua duplo latiore; alarum superiorum cellula 3. cubitali 1^a vix maiore, ad cubitum versus fortiter angustata, nervum 2. medialem in medio recipiente; nervo 3. cubitali valde curvato; nervo areali pone medium cellulae discoidalis sito; vagina crassa, apicem versus dilatata, apice excisa. — Long. 5 mm.

Patria: Texas (Dallas).

2. **B. debilicornis** n. sp. ♂ ♀. *Niger; tegulis et pedum genibus, tibiis, tarsis albescens; feminae tibiis tarsisque apicem versus magis minusve fuscis vel nigricantibus; palpis maris pallidis, feminae fuscis; feminae pronoto, mesonoto, scutello rufis; alis hyalinis, apicem versus vix obscuratis; venis et stigmatate pallide fuscis; costae maiore parte albescens.*

Ovatus, nitidus, fere glaber; capite crasso, pone oculos non dilatato; clypeo brevi, apice truncato; facie inferiore utrobique profunde impressa, medio altius intumescente; antennis debilibus, maris saepius obscure testaceis, thoracem longitudine non superantibus, singulis ramulis longius pilosis, apice obtusis; feminae antennis

tenuibus, thoracem longitudine vix aequantibus, brevissime et parce pilosulis; articulo 3. subcurvato, fere filiformi; fronte intraantennali cariniformi; fovea supraantennali minima; fronte supraantennali fere triangulari et altius elata, medio longitudinaliter impressa; vertice longitudine sua duplo latiore; alarum superiorum nervo 1. cubitali interdum oblitterato; nervo 2. mediali fere interstitiali; cellula tertia cubitali fere quadrata, 1^a fere brevior; nervo areali pone medium cellulae discoidalis sito; feminae vagina hiante, valvulis tenuibus. — Long. 5 mm.

Patria: Rep. Argentina (Mendoza).

3. **B. Jenseni** n. sp. ♂ ♀. *Niger; palpis pallidis; pedum genibus, tibiis, tarsis albidis; tibiis tarsisque apicem versus magis minusve obfuscatis; feminae pronoto, tegulis, mesonoto, scutello, interdum etiam mesopleurorum parte subalari luteis; trium mesonoti loborum disco late nigrato; lituris nigris interdum confluentibus; alis subfuscescenti-hyalinis, summa basi infuscatis; venis fuscis; costa et stigmatibus albicantibus, fusco-circumfusus.*

Parvus, ovatus, nitidus, fere glaber, brevissime vix conspicue pubescens; capite mediocri, pone oculos non dilatato; clypeo longiore, apice truncato, utrobique profunde scrobiculato; facie inferiore vix intumescens; antennis mediocribus, saepius obscure rufescentibus; maris caput una cum thorace longitudine aequantibus, singulis ramulis apicem versus attenuatis et subcrispatis; feminae antennis breviter pilosulis, thoracem longitudine vix aequantibus; articulo 3. apicem versus subattenuato, basi curvato; fronte supraantennali fere triangulari, vix elata, medio subsulcata; fovea supraantennali maiore; vertice longitudine sua triplo latiore; alarum superiorum area intercostali angustissima; nervo 1. cubitali magis minusve oblitterato; nervo 2. mediali cellulae tertiae cubitali inserto; cellula 3. cubitali ad radium versus subdilatata; nervo 3. cubitali super medium magis minusve fracto, angulo interdum appendiculato; nervo areali mox pone medium cellulae discoidalis sito; feminae vagina crassiuscula, apice emarginata. — L. 3,5—4 mm.

Patria: Rep. Argentina (Mendoza).

Wie die vorige Art von Herrn A. C. *Jensen-Haarup*, Randers gesammelt und demselben zu Ehren benannt.

12. Gen. **Stelidarge** Knw.

1. **S. Duckei** n. sp. ♂. *Nigra; pronoti latis lobis lateralibus, mesothorace, tegulis, coxis anterioribus rufis; alis aequabiliter nigricantibus; venis et stigmatate nigris.*

Elongato-ovata, nitida; capite nigro-, thorace luteo-pilosulis; hoc pone oculos rotundato-angustato; clypeo brevi, apice leniter emarginato; antennis trunco brevioribus; vertice longitudine sua sesqui latiore, sulco medio dimidiato; alarum superiorum intervallo inter cubitum et nervum discoidalem nervo intercostali fere brevior; nervo areali medium cellulae discoidalis attingente et ante apicem areae humeralis sito. — Long. 8 mm.

Patria: Brasilia (Barbacena).

Von Herrn A. *Ducke* erbeutet und demselben zu Ehren benannt.

6. Gen. **Tanyphatna** Knw.

4. **T. mamillata** n. sp. ♀. *Testacea; capite, antennis, mesonoto — scutello excepto —, 2 pectoris maculis maioribus, abdominis apice inde a segmento octavo, pedum posticorum tibiis — basi excepta — et tarsis nigris; tarsis intermediis magis minusve infuscatis; palpis et tegulis testaceis; alis fuscis, subhyalinis, venis nigris; stigmatate obscure fusco.*

Ovata, subdepressa, nitida; ore cano-, sincipite et mesonoto brevissime et sparsim nigro-, pronoto et mesopleuris testaceo-pilosulis; capite pone oculos subdilatato; palpis mediocribus, maxillarium articulis 2 paenultimis incrassatis, ultimo elongato, tenui; clypeo sparsim punctato, apice truncato-rotundato; antennis thorace brevioribus, capituli latitudinem longitudine non superantibus, brevissime nigro-pilosis; articulo tertio subcurvato, vix compresso; apice subangustato; fronte non profunde sulcata, sulco inter antennas interrupto; ocello inferiore in linea oculos tangente posito; vertice crasso, sulco tenui dimidiato, longitudine sua non sesqui latiore; alarum superiorum nervis 2 medialibus magis minusve interstitialibus, interdum fere cellulis primae et tertiae insertis; nervo areali medium cellulae discoidalis attingente; cellula tertia cubitali radium versus non vel vix dilatata; tibiis posticis nigro-pilosulis; vagina mediocri, non exserta. — Long. 9 mm.

Patria: Bolivia (Santa Cruz).